



Allergiediagnostik – Karenzzeiten bestimmter Medikamente

Pricktest

Medikament	Hemmung der Testreaktion 0 keine (+) möglich + leicht ++ mittelgradig +++ ausgeprägt	Empfohlene Karenzzeit vor Testung
Orale Antihistaminika		
H1-Blocker 1. Generation (z.B. Dimetinden – Fenistil®)	+++	≥ 3 Tage
H2-Blocker 2. Generation (z.B. Cetirizin, (Des-) Loratadin, u.a.)	+++	7 Tage
Ketotifen	+++	≥ 5 Tage
Glukokortikosteroide („Cortison“)		
Topisch (Langzeitanwendung auf der Haut über mehrere Wochen im Testareal)	+	1 Woche
Nasal oder inhalativ	0	Keine
Systemisch, kurzzeitig	0 / (+)	3-7 Tage*
Systemisch, langfristig	0 / +	3-7 Tage*
Psychopharmaka		
Promethazin (H1-Antagonist)	++	≥ 5 Tage
Trizyklische Antidepressiva (z.B. Doxepin, Amitriptylin, Desipramin u.a.)	++ / +++	3 Tage bis 2 Wochen*
SSRI (z.B. Sertralin, Fluoxetin u.a.)	0	Keine
Andere		
Omalizumab	++	> 4 Wochen
Leukotrienantagonisten (z.B. Montelukast)	0	Keine
Cyclosporin A	0	Keine
Theophyllin	0	Keine
Beta-Adrenerika (z.B. Salbutamol, Salmeterol, Terbutalin)	0	Keine
Topische Calcitoniinhibitoren (z.B. Picrolimus, Tacrolimus)	+	1 Woche
UV-Licht-Therapie (abhängig vom Verfahren)	+++	Bis 4 Wochen*

Tabelle gilt nur als Anhaltspunkt

* Das Absetzen von oralen Glukokortikosteroiden und Psychopharmaka kann den Patienten gefährden!
Deshalb Indikation des Pricktest und mögliche alternative Allergiediagnostik prüfen, kein Absetzen ohne
Rücksprache mit verordnendem Therapeuten

Quelle: modifiziert nach GPAU, Pädiatrische Allergologie 02/2016



Spirometrie

Medikament	Karenzzeit
Kurzwirksame Betamimetika (z.B. Salbutamol)	4 – 6 Stunden
Muskarinantagonisten (z.B. Ipratropiumbromid)	12 Stunden
Langwirksame Betamimetika (z.B. Salmeterol, Formoterol – auch in Kombinationspräparaten, z.B. Viani®)	24 Stunden
Ultralangwirksame Betamimetika	36 Stunden
Langwirksame Muskarinantagonisten	36-48 Stunden
Inhalative Steroide und Leukotrienantagonisten	keine Pause

Tabelle gilt nur als Anhaltspunkt

Quelle: modifiziert nach Paediatrica, Vol. 34; 3-2023

Nasale Provokation

Medikament	Karenzzeit
DNCG, Nedocomil	3 Tage
Glukokortikosteroide („Cortison“), nasal	7 Tage
Glukokortikosteroide („Cortison“), oral / systemisch	7 Tage*
Antihistaminika, nasal	3 Tage
Antihistaminika, oral / systemisch	3 Tage
Alpha-Adrenergika (abschwellende Nasentropfen)	1 Tag
Inhalierbare Bronchospasmolytika (z.B. Salbutamol)	Keine
Trizyklische Psychopharmaka (z.B. Doxepin, Amitriptylin, Desipramin u.a.)	3 Tage*

Tabelle gilt nur als Anhaltspunkt

* Das Absetzen von oralen Glukokortikosteroiden und Psychopharmaka kann den Patienten gefährden!

Deshalb Indikation der nasalen Provokation und mögliche alternative Allergiediagnostik prüfen, kein Absetzen ohne Rücksprache mit verordnendem Therapeuten

Quelle: modifiziert nach Allergo Journal 2002; 11: 29-36